

# 水稻生育速報

令和 2年 6月 5日  
長岡農業普及指導センター

## 生育状況（6月5日現在）

### コシヒカリ定点調査ほの生育（管内7か所）

茎数： 153本/m<sup>2</sup>（指標値比 102% = 並）

葉数： 6.8葉（指標値差 +1.1枚 = 早い）

（6/5指標値は5/30および6/10の値より算出）

※葉数の進みは早く、分けつの発生は順調であるが、ほ場間差が大きい。5月連休植えは中干し開始の適期を迎えている。

**生育が早いので、中干しが遅れないように注意**

## 今後の管理

### 1 田植後25日を過ぎたら生育を確認し、遅れずに中干し開始

（1）6月6日からの1か月予報（6/4発表）では、期間の前半は気温がかなり高くなる見込みとなっており、茎数が急増し、過剰生育が懸念される。

表 目標穂数と中干し開始時期のめやす(コシヒカリ)

（2）田植後25日を過ぎたら生育を確認し、遅れずに中干しを開始するとともに、溝切りも確実に実施する。

目標穂数 (本/m <sup>2</sup> )	植付株数 (株/坪)	中干し開始めやす (株当たり茎数)
360	50株	17本
	60株	14本
340	50株	16本
	60株	13本

（3）特に、連休植えのほ場や生育が過剰になりやすいほ場では、ただちに中干しを開始する。すでに中干し適期を過ぎたほ場もある。

（4）中干しの程度は、田面に小さなヒビが入り、軽く足跡がつく程度までとする。中干し期間中であっても、高温が続き、田面に大きなヒビが入ることが想定される場合には、走り水かん水を行う。

### 2 ワキへの対応

気温の高い状況が続いており、地温の上昇にともなって、田のワキの発生が多くなることが予想される。中干し適期になっていないほ場では夜間落水を行い、根腐れや生育停滞を防止する。

○農作業事故に注意しましょう。特に草刈り作業は周囲に気を配ってください。

○農作業時の熱中症に注意をしましょう。こまめな休憩と水分補給が大切です。

## 定点調査ほ 中干し適期調査(コシヒカリ 令和2年6月5日現在)

地点名	移植日	目標穂数 (本/m <sup>2</sup> )	中干し適期の 茎数割合(%)	6月5日			※ 中干し適期ま での日数のめ やす	※ 中干し適期予 想日
				茎数(本/株)	茎数(本/m <sup>2</sup> )	葉数(葉)		
長岡市乙吉町	5/13	340	70%	10.7	169	6.7	4	6/ 9
長岡市菅畑 (栃尾地域)	5/17	320	70%	8.4	137	6.0	6	6/11
長岡市小国町二本柳 (小国地域)	5/13	340	80%	5.9	95	7.7		
長岡市岩田 (越路地域)	5/ 9	360	75%	8.6	182	7.1	5	6/10
長岡市寺泊京ヶ入 (寺泊地域)	5/18	360	75%	7.9	138	5.5		
長岡市中条北 (中之島地域)	5/ 6	360	70%	14.7	226	7.4	1	6/ 6
小千谷市鴻巣	5/14	340	80%	8.2	122	6.9		
コシヒカリ 平均	5/12	346	74%	9.2	153	6.8	6.9	6/11
※ 平場コシ平均	5/11	355	73%	10.5	179	6.7	4.8	6/ 9
※ 中山間コシ平均	5/14	333	77%	7.5	118	6.9	9.7	6/14

平場コシ：長岡市乙吉、長岡市岩田、長岡市寺泊、長岡市中条北の4か所（それ以外を中山間地コシに分類）。

※中干し適期までの日数のめやす及び中干し適期予想日は、定点調査ほ（H23～R1）の5/30～6/20間の移植後日数と茎数から試算