

水稻生育速報

令和3年6月4日
長岡農業普及指導センター

生育状況（6月4日現在）

コシヒカリ定点調査ほの生育（管内7か所）

茎数：104本/m²（指標値比 75% = 少ない）

葉数：5.5葉（指標値差 -0.1葉 = 並）

（6/4 指標値は5/30 および6/10 の値より算出）

※1か月予報（6月3日発表）では、6月5日から11日までの平均気温は平年より高いと見込まれており、今後、茎数が急激に増加すると予想される。

今後の管理

◎ほ場で茎数を確認し、目標穂数の7割を確保したら遅れずに中干し開始

1 田植後25日頃に生育を確認し、30日頃までに中干し開始

- （1）田植後25日頃に茎数を確認し、コシヒカリは、目標穂数の7割（50株セットで1株当たり15～16本、60株セットで1株当たり13本）を確保したら直ちに中干しを開始する。
- （2）溝切りは、中干しの効果を高めるため、確実に実施する。
- （3）特に、5月連休植えのほ場等では、中干し適期を迎えているほ場も見られるため、遅れずに中干しを開始する。

2 田植後25日頃に葉色が淡く茎数が少ないほ場では、良質茎を早期に確保

- （1）気温の高い状況が続くと、地温の上昇に伴ってワキやアオミドロ・表層剥離の発生がさらに増加し、分けつが抑制されるため、夜間落水等を行い茎数を確保する。
- （2）水温が低く生育が遅れているほ場では、日中の止め水と2～3cmの浅水管理により地温の上昇を図り、分けつの早期発生に努める。

○農作業時の熱中症に注意をしましょう。こまめな休憩と水分補給が大切です。

定点調査ほ 中干し適期調査(コシヒカリ 令和3年6月4日現在)

地点名	移植日	目標穂数 (本/m ²)	6月4日		
			茎数(本/株)	茎数(本/m ²)	葉数(葉)
長岡市乙吉町	5/11	340	7.7	128	5.7
長岡市菅畑 (栃尾地域)	5/21	320	5.3	91	5.3
長岡市小国町二本柳 (小国地域)	5/13	350	3.0	51	5.2
長岡市岩田 (越路地域)	5/10	350	8.1	160	5.1
長岡市寺泊京ヶ入 (寺泊地域)	5/16	350	5.1	83	5.1
長岡市中条北 (中之島地域)	5/5	350	7.7	121	6.2
小千谷市鴻巣	5/13	340	5.7	93	5.6
コシヒカリ 平均	5/12	343	6.1	104	5.5
※ 平場コシ平均	5/10	348	7.1	123	5.5
※ 中山間コシ平均	5/15	337	4.6	78	5.4

平場コシ：長岡市乙吉、長岡市岩田、長岡市寺泊、長岡市中条北の4か所（それ以外を中山間地コシに分類）。