

水稻生育速報

令和3年7月8日
長岡農業普及指導センター

生育状況（7月8日現在）

コシヒカリ定点調査ほの生育（管内7か所平均）

草丈：63 cm	（指標比 94 % = やや短）
茎数：481 本/m ²	（指標比 108 % = やや多）
葉数：10.8 葉	（指標差 +0.2 葉 = 並）
葉色：35.5 (SPAD)	（指標差 -0.7 = 並）

○指標値に比べ、葉色が淡いほ場が見られる。

今後の管理

1 飽水管理で葉色維持

コシヒカリはまもなく幼穂形成期となるため、飽水管理を徹底し、葉色を維持する。

2 早生品種の穂肥

早生品種の2回目の穂肥は、確実に施用する。

3 病虫害防除の徹底

（1）いもち病

いもち病に感染しやすい天候が続いており、管内で葉いもちが確認されている。葉いもちの早期発見に努め、発病を確認したら、ただちに防除を実施する（コシヒカリ BL は除く）。

（2）斑点米カメムシ類

畦畔・農道の除草は、特に斑点米カメムシ類が好むイネ科雑草が結実しない間隔で行い、発生を抑制する。併せて、本田除草を徹底する。

○農作業事故に注意しましょう。特に草刈り作業は周囲に気を配ってください。

○農作業時の熱中症に注意をしましょう。こまめな休憩と水分補給が大切です。

定点調査ほ場生育調査結果(令和3年7月8日現在)

※指標値は5月10日移植を想定。

品種	地点名	移植日	(参考) 前年 移植日	草丈			茎数			葉数			葉色		
				本年 (cm)	前年比	指標比	本年 (本/㎡)	前年比	指標比	本年 (葉)	前年差	指標差	本年 (SPAD)	前年差	指標差
コシヒカリ	長岡市乙吉町	5/11	5/13	66	100%	97%	546	111%	124%	10.9	-0.5	0.2	32.9	-6.0	-3.1
	長岡市菅畑 (栃尾地域)	5/21	5/17	53	80%	77%	509	89%	127%	10.4	-0.9	0.0	36.3	-0.5	0.3
	長岡市小国町二本柳 (小国地域)	5/13	5/13	66	93%	97%	424	101%	92%	11.0	-2.2	0.4	36.4	-7.1	-0.1
	長岡市岩田 (越路地域)	5/10	5/9	69	92%	105%	491	117%	109%	10.5	-1.5	-0.2	36.6	-1.0	0.6
	長岡市寺泊京ヶ入 (寺泊地域)	5/16	5/18	61	98%	92%	510	105%	113%	10.5	0.2	-0.2	36.8	-2.2	0.8
	長岡市中条北 (中之島地域)	5/5	5/6	65	98%	98%	343	79%	76%	11.3	-0.1	0.6	33.7	1.1	-2.3
	小千谷市鴻巣	5/13	5/14	62	87%	95%	544	117%	118%	11.2	-0.3	0.6	36.1	-4.1	-0.9
	コシヒカリ 平均	5/12	5/12	63	93%	94%	481	103%	108%	10.8	-0.8	0.2	35.5	-2.8	-0.7
	※ 平場コシ平均	5/10	5/11	65	97%	98%	473	103%	106%	10.8	-0.5	0.1	35.0	-2.0	-1.0
	※ 中山間コシ平均	5/15	5/14	60	87%	90%	492	102%	112%	10.9	-1.1	0.3	36.3	-3.9	-0.2

※ 平場コシ:長岡市乙吉、長岡市岩田、長岡市寺泊、長岡市中条北の4か所(それ以外を中山間コシに分類)