令和３年度　出穂後の積算気温による収穫適期のめやす　（　9月23日　時点の予想　）

9月23日 までの気温は本年値(長岡アメダスデータ)、
9月24日 からの2週間は平年値－0.1　～ ＋1.9℃、 それ以降は平年値　　0.2℃ の予測値（気象庁「向こう2週間・1か月の予測資料」）に基づいて算出

長岡農業普及指導センター

品種別の出穂期	出穂＼収穫	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5
	日平均気温	28.8	27.3	26.1	26.0	24.3	24.7	19.0	21.5	22.8	21.8	23.3	20.9	22.1	19.9	23.5	24.1	23.0	24.0	21.7	20.9	21.3	22.7	24.0	21.5	22.0	22.0	24.3	23.0	23.0	21.4	20.8	19.6	19.9	20.3	20.7	20.9	20.8	20.3	19.7	19.0	18.7
	8月1日				748	772	797	816	837	860	882	905	926	948	968	991	1015	1038	1062	1084	1105	1126	1149	1173	1195	1217	1239	1263	1286	1309	1330	1351	1371	1391	1411	1432	1452	1473	1494	1513	1532	1551
	8月2日						767	786	807	830	852	875	896	918	938	962	986	1009	1033	1054	1075	1097	1119	1143	1165	1187	1209	1233	1256	1279	1301	1321	1341	1361	1381	1402	1423	1444	1464	1484	1503	1521
コシヒカリ(移植) ✸	8月3日							754	775	798	820	843	864	886	906	930	954	977	1001	1023	1043	1065	1087	1111	1133	1155	1177	1201	1224	1247	1269	1289	1309	1329	1349	1370	1391	1412	1432	1452	1471	1489
	8月4日								745	768	790	813	834	856	876	899	923	946	970	992	1013	1034	1057	1081	1102	1124	1146	1171	1194	1217	1238	1259	1279	1298	1319	1339	1360	1381	1401	1421	1440	1459
	8月5日									737	759	783	803	826	845	869	893	916	940	962	983	1004	1027	1051	1072	1094	1116	1140	1163	1186	1208	1229	1248	1268	1288	1309	1330	1351	1371	1391	1410	1429
	8月6日										728	751	772	794	814	838	862	885	909	931	952	973	996	1020	1041	1063	1085	1109	1132	1155	1177	1198	1217	1237	1257	1278	1299	1320	1340	1360	1379	1397
	8月7日											720	741	763	783	806	831	854	878	899	920	941	964	988	1010	1032	1054	1078	1101	1124	1145	1166	1186	1206	1226	1247	1268	1288	1309	1328	1347	1366
	8月8日												712	734	754	777	802	825	849	870	891	912	935	959	981	1003	1025	1049	1072	1095	1116	1137	1157	1177	1197	1218	1239	1259	1280	1299	1318	1337
✸ 新之助	8月9日													704	724	748	772	795	819	840	861	883	905	929	951	973	995	1019	1042	1065	1086	1107	1127	1147	1167	1188	1209	1229	1250	1269	1288	1307
	8月10日																	93	815	836	857	880	904	925	947	969	994	1017	1040	1061	1082	1102	1121	1142	1162	1183	1204	1224	1244	1263	1282
	8月11日																	69					79	901	923	945	969	992	1015	1036	1057	1077	1097	1117	1138	1159	1179	1200	1219	1238	1257
	8月12日																	44					54	876	898	920	944	967	990	1012	1032	1052	1072	1092	1113	1134	1155	1175	1195	1214	1232
	8月13日																	22					32	854	876	898	922	945	968	990	1010	1030	1050	1070	1091	1112	1133	1153	1173	1192	1210
	8月14日																						11	832	854	876	901	924	947	968	989	1008	1028	1049	1069	1090	1111	1131	1151	1170	1189
	8月15日																						88	810	832	854	878	901	924	946	966	986	1006	1026	1047	1068	1089	1109	1129	1148	1166
	8月16日																						64	786	808	830	854	877	900	922	942	962	982	1002	1023	1044	1065	1085	1105	1124	1142
	8月17日																								786	808	832	855	878	899	920	940	960	980	1001	1022	1042	1063	1082	1101	1120

収穫適期のめやす

※の品種については、高温で登熟しているため、収穫適期のめやすを通常年より2日程度（出穂後積算気温で50℃）早めている。

品種名	出穂期（暫定）	収穫適期のめやす（出穂後積算気温）
※こしいぶき・五百万石・わたぼうし	（左表を参照）	925℃
※ゆきん子舞		900～950℃
コシヒカリ・こがねもち		1000℃
新之助		1050～1100℃
ゆきみらい	7月17日	975℃
つきあかり	7月22日	1100～1200℃

収穫適期は、ほ場間で差があるので、実際の収穫は黄化籾割合（85～90%）を確認して行うこと。

（凡例）
- 900℃～
- 925℃～
- 1000℃～
- 1050℃～
- 1100℃～

※ ✸ は、出穂盛期を表す