

水稻生育速報

令和4年6月7日
長岡農業普及指導センター

生育が早いため、 中干しが遅れないよう注意しましょう！

【生育調査ほの生育状況（6月6日現在）】

（6月6日の指標値は、5月30日および6月10日の値より算出）

こしいぶき（管内4か所平均）

茎数： 269 本/m²（指標値比 142 % = 多い）

葉数： 7.4 葉（指標値差 +1.1 葉 = 早い）

コシヒカリ（管内7か所平均）

茎数： 217 本/m²（指標値比 135 % = 多い）

葉数： 6.5 葉（指標値差 +0.7 葉 = 早い）

○生育が早く、中干し適期を迎えているほ場がみられる。

【今後の管理】

1 早生品種は、中干しを開始

5月連休植えの早生品種は、すでに中干し適期を迎えているほ場がある。
中干しを開始し、併せて溝切りも確実に実施する。

2 コシヒカリは、田植25日後に茎数を確認し、遅れず中干し開始

(1) 田植25日後に茎数を確認し、目標穂数の7割（50株セットで1株当たり15～16本、60株セットで1株当たり13本）を確保したら直ちに中干しを開始し、遅くとも田植30日後までには確実に実施する。

(2) 溝切りは、中干しの効果を高めるため、確実に実施する。

○補植苗は、いもち病の伝染源になるため、速やかに除去。

生育調査ほ中干し適期調査(令和4年6月6日現在)

中干し適期の茎数…コシヒカリ：目標穂数の70%に達した時期の茎数

こしいぶき：目標穂数の80%に達した時期の茎数

品種	地点名	移植日 (月/日)	中干し適期 の茎数 (本/m ²)	6月6日			中干し適期 予想日 ※2
				茎数(本/株)	茎数(本/m ²)	葉数(葉)	
コシヒカリ	長岡市乙吉町	5/11	238	10.0	151	6.2	6/11
	長岡市菅畑 (栃尾地域)	5/18	224	9.5	165	6.5	6/12
	長岡市小国町二本柳 (小国地域)	5/12	245	16.0	284	6.1	6/6
	長岡市岩田 (越路地域)	5/9	245	15.3	297	6.7	6/5
	長岡市寺泊夏戸 (寺泊地域)	5/9	245	12.7	229	6.6	6/7
	長岡市中条北 (中之島地域)	5/3	245	13.2	208	6.9	6/9
	小千谷市鴻巣	5/12	238	11.0	182	6.7	6/10
	コシヒカリ 平均	5/10	240	12.5	217	6.5	
	※1 平場コシ平均	5/8	243	12.8	221	6.6	
※1 中山間コシ平均	5/14	236	12.2	210	6.4		
こしいぶき	長岡市乙吉町 (長岡地域)	5/6	320	11.6	192	7.3	5月初めの移植 では、適期を迎 えているほ場が あります。
	長岡市与板町本与板 (与板地域)	5/4	320	18.0	292	7.6	
	長岡市寺泊下桐 (寺泊地域)	5/4	320	16.7	266	6.9	
	長岡市中野西 (中之島地域)	5/4	320	23.5	324	7.6	
	こしいぶき 平均	5/4	320	17.5	269	7.4	

※1 平場コシ：長岡市乙吉、長岡市岩田、長岡市寺泊夏戸、長岡市中条北の4か所（それ以外を中山間地コシに分類）。

※2 長岡地域コシヒカリ生育調査7地点の10年間（平成24年～令和3年）における5月30日～6月20日の期間の移植後日数と茎数の関係から試算。