





# ブロッコリー、カリフラワー、 キャベツ管理情報 (少雨対策)

JA えちご上越  
上越農業普及指導センター

## <管内の気象状況>



半旬別気温平年差 (高田)



半旬別降水量平年差 (高田)

7月21日の梅雨明け以降、極端な高温、少雨がが続いています。特に降水量は、7月21日から8月20日までの1カ月間で、合計4.5mm(高田)となっており、ほ場が極端な乾燥状態になっています。

## <定植時の留意点>

- ・畦立ては定植直前に行い、畦の土壌水分がある状態で定植を行いましょう。
- ・定植は、なるべく夕方気温が下がり始めた時間に行ってください。
- ・定植直前に、プラグトレイに十分(底から染み出てくるくらい)かん水してから、定植しまししょう。
- ・浅植えで根鉢が畦表面に露出していると、活着不良や枯死につながります。植付の深さに注意しまししょう。
- ・定植後、速やかに株元かん水を行いましょう。また、定植後7日程度はかん水を行い、活着促進を図りまししょう。かん水は夕方に行ってください。

## <定植の晩限>

- ・8月下旬までに定植を完了し、11月末までに収穫しまししょう。これより定植が遅れると、降雪前の収穫が困難になる場合があります。

