

令和8年度 糸魚川売れる米づくりコシヒカリ生育情報 No.2

令和8年6月10日
糸魚川農業普及指導センター

1 6月10日現在の生育状況（指標値との比較）

田植日・調査ほ場	草丈	茎数	葉数	葉色
田植日 5月6～27日 ほ場場所 東海、西川原、東中、榎	長	多	早	並～やや濃

- 生育は一週間程度進んでおり、指標値を上回る状況となっています。
- 1か月気象予報（新潟地方気象台6月4日発表）では、向こう1か月は気温が高く、平年と同様に曇りや雨の日が多い見込みです。
- 現在、5月上旬植えでは、第10葉の展開が進んでいる株も見られます。第8葉以降は2次分げつ（分げつから発生する分げつ）が発生するため、茎数の急激な増加に注意が必要です。

2 今後の管理について

- 5月上旬植えで中干しを実施していないほ場では、早急に中干しを開始してください。
- 5月15日頃に植えたほ場では間もなく中干し時期を迎えます。5月中旬植えでも田植後25日頃に茎数を確認し、遅れないように中干しを始めましょう。
- 中干しを行う前のほ場で、ワキの発生が多く下葉の黄化や褐点が見られる場合、生育が中干し開始の目安に到達する前であっても早めの落水によりガス抜きを行い、そのまま中干しに移行しましょう。
- 中干しは田面全体に小ヒビが入るまで継続しましょう（大ヒビが入るまで継続すると根を傷めます）。
- 中干し効果を高めるため、必ず溝切りを行いましょう。

3 6月10日の生育調査結果

調査項目	ほ場場所 (田植日)	指標値 ※	東海	西川原	東中	榎
			(5月6日)	(5月2日)	(5月27日)	(5月17日)
草丈	本年値 (cm)	28	35	38	18	35
	平年比 (%)		114	131	68	120
	指標比 (%)		126	136	64	125
茎数	茎数 (本/m ²) (一株当たり(本))	200	465 (25.3)	435 (24.7)	87 (4.6)	219 (12.3)
	平年比 (%)		130	161	51	99
	指標比 (%)		232	218	44	110
葉数	本年値 (L)	6.9	8.9	10.0	4.9	7.7
	平年差 (L)		+0.8	+2.5	-1.2	+0.8
	指標差 (L)		+2.0	+3.1	-2.0	+0.8
葉色 (SPAD)	本年値	35.0	38.8	39.7	-	35.3
	平年差		-0.3	+3.6	-	-0.2
	指標差		+3.8	+4.7	-	+0.3

※指標比・差とは、目標とする理想的な生育値（指標値）に対する現在の生育値の割合・差
次回の情報提供は6月18日頃の予定です。