

水稻生育速報 第4号

令和8年6月30日
 柏崎農業普及指導センター
 電話：0257-21-6263
 FAX：0257-22-0936

6月30日現在の生育状況

出穂期は早生品種で3日、コシヒカリで2日早まる見込みです。葉色はさめてきています。

	[草丈]	[莖数]	[葉数]	[葉色]
○コシヒカリ (平場)	並	並	並	やや淡い
○こしいぶき	長い	やや少	早い	並
○新之助	長い	やや少	並	濃い

品種 (田植日)	草丈 (cm)		莖数 上段：本/m ² [下段：本/株]		葉数 (葉)		葉色 (SPAD)		備考
	本年	指標値 比 (%)	本年	指標値 比 (%)	本年	指標値 差	本年	指標値 差	
コシヒカリ 平場(5月11日)	56	104%	489 [29.5]	102%	10.0	0.2	36.7	-1.3	—
中山間(5月26日)	50	93%	436 [23.3]	91%	9.2	-0.6	38.5	0.5	
こしいぶき (5月4日)	60	113%	486 [27.0]	93%	10.9	1.0	40.8	0.8	幼穂長(mm) 2.5 ~ 6.2
新之助 (5月14日)	44	110%	522 [32.3]	92%	10.2	0.2	39.0	3.0	
葉月みのり (4月26日)	72	104%	371 [19.2]	89%	11.6	0.6	37.3	0.2	葉耳間長 +4cm
ゆきみらい (4月24日)	75	-	476 [25.3]	-	12.1	-	49.0	-	葉耳間長 +5cm

コシヒカリ平場6か所/山間2か所、こしいぶき2か所、新之助2か所、葉月みのり2か所の平均値。ゆきみらいは1か所の値

- * こしいぶきは1回目の穂肥時期です。葉色がさめているほ場では、遅れないように施用しましょう。
- * 葉月みのり、ゆきみらいは2回目の穂肥時期です。全量基肥栽培でも葉色に応じて追肥を行いましょ。
- * コシヒカリは中干し終了時期です。飽水管理に移行しましょ。
- * 斑点米カメムシ類が多い傾向です。畦畔や水田内の雑草管理を行いましょ。