


1 回目穂肥は生育診断、2 回目穂肥は確実に施用

1 中干しは終了し、飽水管理に移行

- コシヒカリの出穂期は、平年より1日程度早まると予想されています。（平年出穂期8/4）
- 出穂期まで1か月となっています。中干しを終了し、徐々に飽水管理に移行しましょう。

【飽水管理の方法】



輪番、番水など、
地域の水管理体制
も再確認しよう！



飽水管理とは…

水尻は止水し、自然落水で田面の水がなくなり、溝や足跡の底に水が残る程度になったらかん水する。

2 コシヒカリの穂肥対応の考え方

(1) 1 回目穂肥は生育診断をしてから施用（出穂期18～15日前）

- 1 回目穂肥時期が早すぎると節間が伸長し倒伏が助長されます。また、もみ数過剰による品質低下を防ぐため、稲姿に合わせた穂肥量としましょう。

表 1 1 回目穂肥時の稲姿と施用のめやす

1 回目穂肥時の稲姿 (出穂期18日前)	穂肥対応の 考え方	穂肥施用のめやす	
		施用時期	窒素施用量
生育めやす 草丈：72cm 葉色(SPAD)：35	基準どおりの 時期・量を施用	出穂期18日前	1.0～1.5kg /10a
めやすより草丈長く 葉色淡い	遅めに施用	出穂期15日前	1.0 kg/10a

(2) 2 回目穂肥は必ず施用し、後期栄養を確保（出穂期10日前）

- 出穂期10日前に窒素成分で1～1.5kg/10aを施用しましょう。
- 草丈が長く、1 回目穂肥を施用できなかった場合でも、後期栄養確保のため、2 回目穂肥は必ず施用しましょう。（2 回目穂肥は下位節間の伸長に影響しません）

(3) 出穂期後の高温が予想される場合は、3 回目穂肥を施用



2 回目穂肥は必ず
施用し、高温登
熟に備えよう！

(4) 全量基肥一発体系の場合

- 葉色が急激にさめ、出穂期の葉色（SPAD）が32～33を下回ると予想される場合は、出穂期10日前に追加穂肥を施用しましょう。

【QRコードを読み取り稲作情報を確認しよう】

JA魚沼 北魚沼地区
営農情報（LINE）
はこちら →



魚沼農業普及指導
センターHP稲作情報
はこちら →



お問い合わせ先

J A 魚沼北魚沼基幹営農センター
025-793-1770
魚沼農業普及指導センター
025-792-1309

こまめな水分補給で、熱中症を予防しましょう。農作業事故に気を付けましょう。