

水稻生育速報 第5号

令和8年7月8日
 柏崎農業普及指導センター
 電話：0257-21-6263
 FAX：0257-22-0936

7月8日現在の生育状況

出穂は4～5日早まる見込み。コシヒカリの草丈はやや長め、葉色は低下傾向です。

	[草丈]	[莖数]	[葉数]	[葉色]
○コシヒカリ (平場)	やや長	並	並	並
○こしいぶき	長い	少	早い	並
○新之助	並	少	並	やや淡

品種 (田植日)	草丈 (cm)		莖数 上段：本／㎡ [下段：本／株]		葉数 (葉)		葉色 (SPAD)		備考
	本年	指標値 比 (%)	本年	指標値 比 (%)	本年	指標値 差	本年	指標値 差	
コシヒカリ 平場(5月11日)	66	105%	453 [27.3]	99%	10.7	0.2	34.8	-0.8	幼穂長(mm) 0～5.5
中山間(5月26日)	59	94%	453 [23.9]	99%	10.2	-0.3	38.9	3.3	—
こしいぶき (5月4日)	69	113%	430 [23.9]	94%	11.7	0.8	37.0	-0.3	葉耳間長 +2～2.8cm
新之助 (5月14日)	50	98%	514 [31.8]	89%	11.0	0.2	35.7	-1.9	—
葉月みのり (4月26日)	86	99%	423 [21.7]	107%	12.0	-0.1	43.0	4.6	出穂期 7月9日頃
ゆきみらい (4月24日)	87	—	314 [16.7]	—	11.6	—	36.0	—	出穂期 7月7日頃

コシヒカリ平場6か所／山間2か所、こしいぶき2か所、新之助2か所、葉月みのり2か所の平均値。ゆきみらいは1か所の値

- ＊ コシヒカリは5月10日以前に植えたほ場では、週末に1回目の穂肥時期を迎えます。
- ＊ 全量基肥栽培でも葉色が低下している圃場が見られます。草丈を確認し追肥を行いましょう。(参考：稲作だよりNo.5)
- ＊ こしいぶきは、2回目の穂肥時期です。確実に施用しましょう。
- ＊ いもち病が発生しています。病斑を見つけたらすぐ防除しましょう。
- ＊ カメムシが多く発生しています。水田内及び畦畔の除草を徹底しましょう。