

令和8年度 出穂後の積算気温による収穫適期のめやす

7月12日 までの気温は本年値(長岡アメダスデータ)
7月13日 からの2週間は平年値+0.9～ +3.2℃、 それ以降は平年値 0.3℃ の予測値(気象庁「向こう2週間・1か月の予測資料」)に基づいて算出
長岡普及指導センター

品種別の出穂期		出穂\収穫 日平均気温	8月																													9月																	
			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			26.9	26.8	26.8	26.7	26.6	26.5	26.5	26.4	26.3	26.2	26.2	26.1	26.0	25.9	25.8	25.7	25.6	25.5	25.4	25.3	25.2	25.1	25.0	24.8	24.7	24.6	24.5	24.3	24.2	24.0	23.8	23.7	23.5	23.3	23.1	22.9	22.7	22.4	22.2	22.0	21.8	21.5	21.3	21.1			
		7月6日	895	922	949	976	1002	1029	1055	1082	1108	1134	1160	1187	1213	1238	1264																																
		7月7日	870	897	923	950	977	1003	1030	1056	1082	1109	1135	1161	1187	1213	1239	1264																															
		7月8日	843	870	897	924	950	977	1003	1030	1056	1082	1108	1134	1160	1186	1212	1238	1263																														
		7月9日	815	842	869	895	922	949	975	1001	1028	1054	1080	1106	1132	1158	1184	1210																															
なつひめ	ゆきみらい	7月10日	786	813	840	867	893	920	946	973	999	1025	1051	1078	1104	1129	1155																																
		7月11日	758	785	812	839	865	892	918	945	971	997	1023	1050	1076	1101	1127	1153	1179	1204	1229																												
		7月12日	757	784	811	838	864	891	917	944	970	996	1022	1049	1075	1100	1126	1152	1178	1203																													
		7月13日	732	759	785	812	839	865	892	918	944	971	997	1023	1049	1075	1101	1126	1152	1177	1203																												
		7月14日		731	758	785	812	838	865	891	917	943	970	996	1022	1048	1073	1099	1125	1150	1176	1201																											
		7月15日			731	757	784	810	837	863	890	916	942	968	994	1020	1046	1072	1097	1123	1148	1173	1199																										
		7月16日				730	756	783	809	836	862	888	914	941	967	992	1018	1044	1070	1095	1120	1146	1171	1196																									
		7月17日					729	755	782	808	834	861	887	913	939	965	991	1016	1042	1067	1093	1118	1143	1168	1193																								
		7月18日						728	754	781	807	833	859	886	912	937	963	989	1015	1040	1065	1091	1116	1141	1166	1191	1216																						
		7月19日							727	754	780	806	833	859	885	911	936	962	988	1013	1039	1064	1089	1114	1139	1164	1189	1213																					
		7月20日								727	754	780	806	832	858	884	910	935	961	987	1012	1037	1062	1088	1113	1137	1162	1187																					
		7月21日									727	753	779	806	832	857	883	909	935	960	985	1011	1036	1061	1086	1111	1136	1160																					
		7月22日										727	753	779	805	831	857	882	908	934	959	984	1009	1035	1060	1084	1109	1134	1158	1182	1207	1231																	
		7月23日											726	752	778	804	830	856	881	907	932	958	983	1008	1033	1058	1082	1107	1132	1156	1180	1204	1228																
		7月24日												726	752	777	803	829	855	880	905	931	956	981	1006	1031	1056	1080	1105	1129	1153	1177	1201	1225															
		7月25日													724	750	776	802	827	853	878	904	929	954	979	1004	1028	1053	1078	1102	1126	1150	1174	1198	1221														
		7月26日														723	748	774	800	825	851	876	901	926	951	976	1001	1025	1050	1074	1098	1122	1146	1170	1193	1217	1240												
		7月27日															722	748	773	799	824	849	875	900	925	949	974	999	1023	1048	1072	1096	1120	1143	1167	1190	1213	1236											
		7月28日																721	746	772	797	823	848	873	898	923	947	972	996	1021	1045	1069	1093	1116	1140	1163	1186	1209	1232										
		7月29日																		719	745	770	796	821	846	871	896	920	945	970	994	1018	1042	1066	1090	1113	1136	1159	1182	1205	1227								
		7月30日																			718	743	769	794	819	844	869	893	918	943	967	991	1015	1039	1063	1086	1109	1132	1155	1178	1200	1222							
		7月31日																																															
		8月1日																																															
		8月2日																																															

収穫適期のめやす

※の品種については、高温で登熟する可能性があるため、収穫適期のめやすを通常年より2日程度(出穂後積算気温で50℃)早めている。

※出穂後5～24日の(20日間)平均気温の平均が26.2℃以上の年度を高温年としている。

品種名	出穂期（暫定）	収穫適期のめやす (出穂後積算気温)
なつひめ	(左表を参照)	1000℃
※ゆきみらい・こしいぶき・五百万石・わたぼうし		925℃
※ゆきん子舞		900～950℃
※つきあかり		1050～1150℃
コシヒカリ・こがねもち		1000℃
新之助		1050～1100℃

収穫適期は、ほ場間で差があるので、実際の収穫は黄化靱割合(85～90%)を確認して行うこと。

(凡例)

900℃～

950℃～

1000℃～

1050℃～

1100℃～

※ ★ は、出穂盛期を表す

収穫適期のめやす

※の品種については、高温で登熟する可能性があるため、収穫適期のめやすを通常年より2日程度(出穂後積算気温で50℃)早めている。

※出穂後5～24日の(20日間)平均気温の平均が26.2℃以上の年度を高温年としている。

品種名	出穂期（暫定）	収穫適期のめやす (出穂後積算気温)
なつひめ	(左表を参照)	1000℃
※ゆきみらい・こしいぶき・五百万石・わたぼうし		925℃
※ゆきん子舞		900～950℃
※つきあかり		1050～1150℃
コシヒカリ・こがねもち	(左表を参照)	1000℃
新之助		1050～1100℃

収穫適期は、ほ場間で差があるので、実際の収穫は黄化割合(85～90%)を確認して行うこと。

(凡例)

900℃～

950℃～

1000℃～

1050℃～

1100℃～