

出穂期10日前の穂肥で収量・品質を確保！

- 今年の登熟期間も、高温が続くと予想されています。
後期栄養を確保するために、**穂肥を確実に施用し、**
収量・品質を安定確保しましょう。
- 高温が続き、葉色がさめ始めています。出穂前に葉色が大きく低下すると品質低下の恐れがあるため、確実に穂肥を施用し、葉色を維持しましょう。
- 基肥一発施肥の場合も、葉色が薄い場合は、追加の穂肥を施用しましょう。

1 出穂期10日前穂肥（2回目穂肥）は適期に確実に施用！

表1 コシヒカ리의出穂期予想と穂肥適期

田植日	出穂期予想	← 全量基肥一発の追肥時期 →		
		1回目穂肥 (18～15日前)	2回目穂肥 (出穂期10日前)	3回目穂肥 (3日前)
5/15	8/1	7/14～17	7/22	7/29
5/20	8/3	7/16～19	7/24	7/31
5/25	8/5	7/18～21	7/26	8/2

※ 出穂期は、近年平均（過去10年）より1日程度早まる見込みです。

※ 地域によって、気象条件やほ場条件が異なるため生育状況を確認してください。

表2 コシヒカ리의2回目穂肥施用量

窒素成分量	[施用例] 越後の輝き有機50穂肥 または 越後の輝き有機30穂肥
1～1.5 kg/10a	8.3～12.5 kg/10a

2回目穂肥は下位節間の伸長には影響しません。



止葉

※葉の付け根にある突起＝葉耳

○ 葉色がかなり薄い場合や、3回目穂肥の対応が難しい場合は、2回目穂肥の増量を検討しましょう。

○ 全量基肥一発施肥体系の場合

- ・ 出穂期の葉色（SPAD値）が32～33を下回ると予想される場合は、出穂期の10日前頃に追加穂肥を施用しましょう。（窒素成分1～1.5kg/10a）

図1 葉の出方による穂肥時期の診断方法

止葉の葉耳とその下の葉の葉耳が並んだ頃（葉耳間長＝0cm）が出穂のおよそ10日前です。

【QRコードを読み取り稲作情報を確認しよう】

JA魚沼 北魚沼地区
営農情報(LINE)
はこちら →



魚沼農業普及指導
センターHP稲作情報
はこちら →



お問い合わせ先

JA魚沼北魚沼基幹営農センター 025-793-1770
（SPADの貸し出しもJAで行っています）

魚沼農業普及指導センター 025-792-1309

こまめな水分補給で、熱中症を予防しましょう。農作業事故に気を付けましょう。