

水稻生育速報No.6

令和8年7月21日

～常態化する異常高温に備えたコンパクトなイネづくり～ 巻農業普及指導センター

【コシヒカリは葉色やや濃い、今後も高温傾向 ほ場を観察し、葉色が淡いほ場は追加穂肥】

- ◎分施栽培は、2回目穂肥を確実に施用
- ◎葉色が淡い全量基肥栽培は、追加穂肥を施用
- ◎飽水管理(定期的な水の入れ替え)を徹底

【出穂期予想】 コシヒカリ(連休植え):8月1日 こしいぶき:7月22日(平年より3日早い)

【水稻生育データ】 コシヒカリの葉色 分施栽培「やや濃い」、全量基肥栽培「やや濃い」

7月21日現在

品種名	移植日	草丈 (cm)		茎数 (本/㎡)		主幹葉数 (L)		葉色 (SPAD)		7/10 からの 葉色変化
		本年値	指標比%	本年値	指標比%	本年	指標差	本年	指標差	
コシヒカリ分施栽培	5月3日	89	116	380	97	13.2	1.1	34.3	1.3	0.1
コシヒカリ全量基肥栽培	5月5日	85	110	375	96	12.4	0.3	34.5	1.5	▲ 0.7
こしいぶき	5月4日	89	115	570	132	12.6	0.0	39.9	3.9	—

※指標値は、高品質米生産のための目指すべき生育値。

※コシヒカリ分施栽培4ほ場、全量基肥栽培13ほ場、こしいぶき3ほ場の平均値を使用

【管理ポイント】

- ・連休植えコシヒカリの分施栽培の2回目穂肥は、出穂10日前を過ぎているので、葉色を観察し、10a当たり窒素成分で1.0～1.5kg程度を確実に施用する。
- ・コシヒカリの全量基肥栽培では、ほ場をよく観察し、出穂期の葉色が指標値(SPAD値33)を下回ると予想される場合は、速やかに10a当たり窒素成分で1.0～1.5kg程度を追肥する。
- ・早生品種は、斑点米発生防止のため、穂ぞろい期(出穂期3～7日後)にほ場全体へ薬剤散布する。
- ・全品種で飽水管理を徹底し、肥料成分や地力窒素の吸収を促す。

「水稻技術対策資料No.5」(巻農業振興部でホームページ検索)も参考にしてください。
作業時はこまめに水分を補給し、熱中症に注意しましょう。農作業事故にも注意しましょう。

(次回調査は7月27日)



参考(コシヒカリほ場別調査データ)

7月21日現在

区分	調査地点	移植日	草丈(cm)		茎数(本/m ²)		主幹葉数(L)		葉色(SPAD)		葉色差 7/10-7/21
			本年値	指標比%	本年値	指標比%	本年	指標差L	本年	指標差	
分施	県・西川(升潟)	5月10日	83	108	455	117	13.0	0.9	34.7	1.7	▲ 0.4
分施	県・岩室(樋曾)	4月28日	90	117	348	89	13.1	1.0	37.2	4.2	▲ 0.6
分施	JA・黒崎(黒鳥)	5月3日	98	127	347	89	13.9	1.8	34.0	1.0	▲ 0.8
分施	JA・潟東(今井)	5月3日	85	110	370	95	12.6	0.5	31.4	-1.6	2.1
分施栽培 4ほ場平均		5月3日	89	116	380	97	13.2	1.1	34.3	1.3	0.1
全量基肥	県・巻(漆山)	5月14日	83	108	468	120	12.5	0.4	34.6	1.6	▲ 0.6
全量基肥	県・潟東(遠藤)	5月7日	89	116	497	127	13.5	1.4	37.8	4.8	▲ 1.6
全量基肥	JA・巻(竹野町)	5月5日	84	109	320	82	12.2	0.1	34.4	1.4	▲ 3.1
全量基肥	JA・漆山(馬堀)	5月13日	90	117	388	99	12.9	0.8	38.9	5.9	▲ 1.0
全量基肥	JA・岩室(津雲田)	4月27日	89	116	397	102	12.8	0.7	34.4	1.4	▲ 0.3
全量基肥	JA・岩室(北野)	5月3日	86	112	412	106	12.8	0.7	32.8	-0.2	▲ 3.2
全量基肥	JA・黒崎(木場)	5月11日	76	99	313	80	13.4	1.3	29.1	-3.9	▲ 6.3
全量基肥	JA・潟東(横戸)	5月5日	88	114	303	78	11.8	-0.3	33.9	0.9	3.9
全量基肥	JA・中之口(三ツ門)	5月2日	85	110	333	85	12.0	-0.1	31.3	-1.7	0.2
全量基肥	JA・西川(見帯)	5月3日	90	117	395	101	11.9	-0.2	35.6	2.6	0.3
全量基肥	JA・西川(六分)	5月5日	85	110	436	112	11.9	-0.2	33.8	0.8	0.5
全量基肥	JA・西川(矢島)	5月7日	77	100	336	86	11.9	-0.2	34.2	1.2	▲ 0.9
全量基肥	JA・西(亀貝)	5月4日	84	109	280	72	11.9	-0.2	38.1	5.1	2.6
全量基肥栽培 13ほ場平均		5月5日	85	110	375	96	12.4	0.3	34.5	1.5	▲ 0.7
17ほ場全体平均		5月5日	86	112	376	97	12.6	0.5	34.5	1.5	▲ 0.5

5/7以前の移植 14ほ場平均	5月3日	87	113	367	94	12.5	0.4	34.5	1.5	▲ 0.1
5/10以降移植 4ほ場平均	5月12日	83	108	406	104	13.0	0.9	34.3	1.3	▲ 2.1

【コシヒカリの葉色の推移】



参考(こしいぶきほ場別調査データ)

7月21日現在

区分	調査地点	移植日	草丈(cm)		茎数(本/m ²)		主幹葉数(L)		葉色(SPAD)	
			本年値	指標比%	本年値	指標比%	本年	指標差L	本年	指標差
全量基肥	県・巻(堀山新田)	5月5日	84	108	722	168	13.2	0.6	40.9	4.9
全量基肥	JA・漆山(漆山)	5月5日	91	117	537	125	12.6	0.0	39.3	3.3
全量基肥	JA・西(小瀬)	5月3日	93	119	450	105	12.0	-0.6	39.5	3.5
4ほ場平均		5月4日	89	115	570	132	12.6	0.0	39.9	3.9