

水稻生育速報 第6号

7月21日現在の生育状況

令和8年7月21日
 柏崎農業普及指導センター
 電話：0257-21-6263
 FAX：0257-22-0936

**コシヒカリ・新之助の生育は5～7日早まっている。
 コシヒカリの出穂は7月28日～30日。新之助は8月5日頃の見込み。**

	[草丈]	[茎数]	[葉数]	[葉色]
○コシヒカリ (平場)	やや長	少	早い	並
○こしいぶき	長い	やや少	並	やや濃
○新之助	やや長	少	早い	並

品種 (田植日)	草丈 (cm)		茎数 上段：本/㎡ [下段：本/株]		葉数 (葉)		葉色 (SPAD)		備考
	本年	指標値 比 (%)	本年	指標値 比 (%)	本年	指標値 差	本年	指標値 差	
コシヒカリ 平場(5月11日)	86	108%	369 [22.3]	88%	12.4	0.8	33.1	0.6	出穂期 7月28日頃
中山間(5月26日)	88	110%	386 [20.5]	92%	12.0	0.4	35.7	3.2	8月5日頃
こしいぶき (5月4日)	92	130%	391 [21.8]	93%	12.2	0.0	37.7	1.7	出穂期 7月18日
新之助 (5月14日)	68	103%	399 [24.7]	74%	12.8	0.8	34.5	0.5	まもなく 穂肥2回目
葉月みのり (4月26日)	94	88%	360 [18.6]	89%	12.0	-0.3	40.5	2.7	出穂期 7月9日
ゆきみらい (4月24日)	103	-	517 [27.5]	-	11.6	-	49.4	-	出穂期 7月7日

コシヒカリ平場6か所/中山間2か所、こしいぶき2か所、新之助2か所、葉月みのり2か所の平均値、ゆきみらいは1か所の値。

- * 生育診断に基づき **2回目の穂肥は遅れないように確実に実施しましょう。**
- * 今後、気温の高い日が予想されます。急激に葉色が低下した場合は、3回目の穂肥を実施しましょう。
- * いもち病が発生しています。病気を発見したら直ちに防除しましょう。
- * 極早生・早生品種は登熟時期を迎えています。飽水管理を行いましょう。