

水稻生育速報No.7

～常態化する異常高温に備えたコンパクトなイネづくり～

令和8年7月27日
巻農業普及指導センター

8月は高温予報、葉色を確認し、 葉色が淡いほ場は追加穂肥

【コシヒカリの追加穂肥のめやす（分施栽培、全量基肥栽培とも）】

◎出穂期の葉色がSPAD値33（葉色板・単葉：4.5）を下回ると予想される場合、窒素成分で1.0～1.5kg/10a追肥する。

◎出穂期が早まっているため、追肥が必要なほ場は早めに施用する。

【7/25～8/24の新潟県の気象予報（新潟地方気象台7月23日発表）】

今後1か月は高温になる確率が60%と高い

○1週目（7/25～31）高い50%、2週目（8/01～07）高い80%、3～4週目（8/08～21）高い50%

【コシヒカリ出穂期予想】 連休植え：7月29日頃 中旬植え：8月2日頃

【7/27コシヒカリ葉色データ】 指標値差「濃い」（平年に比べて褪色が緩やか）

区分	移植日	葉色（SPAD値）		
		本年	指標値差	前回差 7/21-7/27
分施栽培	5月3日	35.5	3.5	1.2
全量基肥栽培	5月5日	34.2	2.2	-0.3
管内平均	5月5日	34.5	2.5	0.0

※指標値は、高品質米生産のための目指すべき生育値

※分施栽培4ほ場、全量基肥栽培13ほ場の平均値を使用

★作業時はこまめな水分補給と休憩で熱中症を予防し、農作業事故にも注意しましょう。

「水稻技術対策資料No.5」（巻農業振興部でホームページ検索）

（次回調査は7月30日）

参考(コシヒカリほ場別調査データ)

7月27日現在

区分	調査地点	移植日	葉色 (SPAD)		
			7/27 測定値	指標値差	前回差 7/21-7/27
分施	県・西川(升潟)	5月10日	31.7	▲ 0.3	▲ 3.0
分施	県・岩室(樋管)	4月28日	36.6	4.6	▲ 0.6
分施	JA・黒崎(黒鳥)	5月3日	40.4	8.4	6.4
分施	JA・潟東(今井)	5月3日	33.3	1.3	1.9
分施栽培 4ほ場平均		5月3日	35.5	3.5	1.2
全量基肥	県・巻(漆山)	5月14日	31.2	▲ 0.8	▲ 3.4
全量基肥	県・潟東(遠藤)	5月7日	36.3	4.3	▲ 1.5
全量基肥	JA・巻(竹野町)	5月5日	34.4	2.4	0.0
全量基肥	JA・漆山(馬堀)	5月13日	36.6	4.6	▲ 2.3
全量基肥	JA・岩室(津雲田)	4月27日	35.5	3.5	1.1
全量基肥	JA・岩室(北野)	5月3日	34.5	2.5	1.7
全量基肥	JA・黒崎(木場)	5月11日	33.1	1.1	4.0
全量基肥	JA・潟東(横戸)	5月5日	35.5	3.5	1.6
全量基肥	JA・中之口(三ツ門)	5月2日	31.2	▲ 0.8	▲ 0.1
全量基肥	JA・西川(見帯)	5月3日	34.7	2.7	▲ 0.9
全量基肥	JA・西川(六分)	5月5日	34.9	2.9	1.1
全量基肥	JA・西川(矢島)	5月7日	34.4	2.4	0.2
全量基肥	JA・西(亀貝)	5月4日	32.6	0.6	▲ 5.5
全量基肥栽培 13ほ場平均		5月5日	34.2	2.2	▲ 0.3
17ほ場全体平均		5月5日	34.5	2.5	0.0

5/7以前の移植 14ほ場平均	5月3日	34.9	2.9	0.4
5/10以降移植 4ほ場平均	5月12日	33.2	1.2	▲ 1.2

【コシヒカリの葉色の推移】

