

水稻生育速報 第7号

令和8年7月27日
柏崎農業普及指導センター
電話：0257-21-6263
FAX：0257-22-0936

7月27日現在の生育状況

**出穂は平年より5～7日早め。
コシヒカリ7月28日、新之助は8月5日予想。
葉色は並。**

品種 (田植日)	葉色 (SPAD)		(予想) 出穂期	
	本年	指標値 差	本年	前年差
コシヒカリ 平場(5月11日)	33.0	0.0	7月28日頃	－6日
中山間(5月26日)	35.5	2.5	8月5日頃	－7日
新之助 (5月14日)	34.8	0.8	8月5日頃	－3日

コシヒカリ平場6か所／中山間2か所、新之助2か所の各平均値。

葉色がさめているほ場では、追肥してね！



- ＊ 今後も高温気象が予想されるため、葉色がさめている圃場では、出穂3日前までに追肥を行いましょう。
- ＊ 新之助は、2回目の穂肥を直ちに実施しましょう。
- ＊ 新之助では、現在も葉いもちが確認されています。病斑を見つけたら早急に防除をして下さい。(散布時には葉月みのり等の収穫の早い品種へのドリフトには十分注意してください。)
- ＊ 出穂期前後は最も水を必要とする時期です。用水を地域全体で大切に使用しながら、飽水管理を行いましょう。

【参考】品種別の予想収穫適期（7月27日現在）

品種	平均出穂期	予想収穫適期*（前年差）
葉月みのり	7月9日	8月12日（-2日）
こしいぶき	7月18日	8月22日（-3日）
コシヒカリ（平場）	7月28日（予想）	9月5日（-4日）

葉月みのり、こしいぶきは高温年における出穂後積算気温から推測
出穂後積算気温のめやす 葉月みのり：900℃、こしいぶき：925℃、コシヒカリ：1000℃