

水稻生育速報 第8号

令和8年7月30日
 柏崎農業普及指導センター
 電話：0257-21-6263
 FAX：0257-22-0936

7月30日現在の生育状況

コシヒカリ、新之助ともに出穂期は早い。
(コシヒカリは7月28日、新之助は8月5日頃)
収穫も早まる見込み。

	[草丈]	[莖数]	[葉数]	[葉色]
○コシヒカリ (平場)	長い	並	並	やや濃
○新之助	短い	やや少	早い	並

品種 (田植日)	草丈 (cm)		莖数 上段：本/㎡ [下段：本/株]		葉数 (葉)		葉色 (SPAD)		予想出穂期	
	本年	指標値 比 (%)	本年	指標値 比 (%)	本年	指標値 差	本年	指標値 差	本年	平年差
コシヒカリ 平場(5月11日)	102	113%	361 [21.8]	98%	12.5	-0.3	33.6	1.1	7月28日頃	-6日
中山間(5月26日)	101	112%	400 [21.2]	108%	13.1	0.3	35.0	2.5	8月5日頃	-7日
新之助 (5月14日)	80	90%	360 [22.3]	95%	13.2	0.7	34.5	-0.5	8月5日頃	-3日

コシヒカリ平場6か所/中山間2か所、新之助2か所の各平均値。

- * 新之助は、葉色が薄い(SPAD 値 34 未満)場合は出穂 3 日前までに追肥をしましょう。
- * 出穂期前後は最も水を必要とする時期です。用水を地域全体で大切に使用しながら、出穂後 25 日以降まで飽水管理を行いましょう。
- * 大型のカメムシが多発しています。多いほ場では追加防除をしましょう。

【参考】品種別の予想収穫適期のめやす (7月30日現在)

～必ず籾の黄化率 85～90%を確認して収穫しましょう～

品種	平均出穂期	予想収穫適期 (前年差)
葉月みのり	7月9日	8月11日 (-3日) ※
こしいぶき	7月18日	8月22日 (-3日) ※
コシヒカリ (平場)	7月28日	9月5日 (-4日)

※高温年における出穂後積算気温から推測

出穂後積算気温のめやす 葉月みのり：900℃、こしいぶき：925℃、コシヒカリ：1000℃