

南魚沼水稻生育速報 No.9

令和8年8月19日
南魚沼農業普及指導センター

- ・今年は高温年に相当し、かつ、出穂期が早まったことから、収穫準備を早急に開始！
- ・出穂期後 25 日まで飽水管理を徹底！

1 コシヒカリ出穂期と収穫期のめやす（8月14日現在）

地域	田植日	出穂期※1	収穫めやすの 積算温度(°C)	収穫開始 のめやす
平坦地 (標高183m) ※2	5月10日	7月24日	950°C ※4	8月30日
	5月15日	7月30日		9月4日
	5月20日	8月1日		9月6日
	5月25日	8月2日		9月7日
	5月30日	8月4日		9月9日
高標高地 (標高340m) ※3	5月15日	8月1日	950°C ※4	9月7日
	5月20日	8月4日		9月10日
	5月25日	8月6日		9月12日
	5月30日	8月8日		9月15日

※1 出穂期:生育調査ほ場の出穂期を基に推定、※2 観測地点:南魚沼市城内（メッシュ気象データ）

※3 観測地点:湯沢町（アメダス）、※4 高温年の積算温度を適用

積算温度は、8月14日までは本年値で、それ以降は近年の令和5年～7年の平均値で算出。
毎週水曜日に、その時点までの本年値で算出した積算温度による収穫適期情報を発出予定。

2 今後の管理

(1) 早めの収穫準備と適期収穫

- ・今年はお穂後5～24日の平均気温が概ね26°Cを超える高温年と見込まれています。
- ・更に、出穂期が5月10日植えで平年より8～10日程度、5月20日植えで5日程度と、田植えが早いほど早まっています。
- ・このことから、早急に収穫準備を開始し、かつ、田植え日ごとに出穂期がバラついていくことから、ほ場ごとに籾の黄化率を確認し適期に収穫しましょう。

(2) 飽水管理の徹底

- ・出穂期後25日まで、水尻を止めた状態でかん水と自然減水を繰り返す飽水管理を徹底しましょう。

(3) クサネムの徹底除去

- ・クサネムの種子が混入すると等級低下の要因になりますので、必ずほ場から除去しましょう。

農作業中の事故防止や熱中症対策として、こまめな休憩と水分補給を行いましょう。

問い合わせ先 作物担当 電話 772-3337/FAX 772-2612