令和８年度　刈取適期積算気温表（8月27日　現在）（本年値8月26日まで、農業気象メッシュデータ【三条市興野】の日平均気温を使用）

三条農業普及指導センター

出　穂　期（月/日）　（品種名の表示は管内の平均的な出穂期）

収穫適期（月/日）	日平均気温（℃）	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20
		ゆきん子舞			こしいぶき			こがねもち						コシヒカリ 5月連休植え				コシヒカリ 5月中旬植え						新之助 5月中旬植え				新之助 5月下旬植え									
21日	26.3	1030	1002	975	946																																
22日	26.5	1056	1029	1002	973	943	912	883	854	825	797	769	745	718	692	667	639	612	584	557	529	502	474	445	415	386	360	334	310	282	253	223	196	168	139	111	81
23日	26.9	1083	1056	1029	999	970	939																														
24日	29.3	1113	1085	1058	1029	999	969	939	910	882	853	825	801	774	749	723	695	668	640	613	586	558	530	501	471	443	416	390	366	338	309	280	252	224	196	167	138
25日	29.5			1087	1058	1028	998	969	939																												
26日	27.6	1170	1142	1115	1086	1056	1026	996	967	939	911	883	858	831	806	780	752	725	698	670	643	615	587	559	528	500	473	447	423	395	366	337	309	281	253	224	195
27日	25.6					1082	1051	1022	992	964	936																										
28日	25.3	1221	1193	1166	1137	1107	1077	1047	1018	990	962	934	909	882	857	831	803	776	749	721	694	666	638	610	579	551	524	498	474	446	417	388	360	332	304	275	246
29日	23.5							1071	1041	1013	985	957	932																								
30日	26.0	1270	1242	1216	1186	1157	1126	1097	1067	1039	1011	983	958	932	906	880	853	826	798	771	743	715	688	659	629	600	573	547	524	495	466	437	410	382	353	324	295
31日	27.8								1095	1067	1039	1011	986	960	934																						
1日	26.3	1324	1297	1270	1240	1211	1180	1151	1121	1093	1065	1037	1012	986	960	934	907	880	852	825	797	770	742	713	683	654	628	602	578	549	520	491	464	436	407	379	349
2日	26.2										1091	1063	1039	1012	986	961	933																				
3日	24.5	1375	1347	925-950℃		1261	1231	1202	1172	1144	1116	1088	1063	1037	1011	985	958	931	903	876	848	820	793	764	734	705	678	652	629	600	571	542	515	487	458	429	400
4日	23.7			950-975℃									1087	1060	1035	1009	981	955	927																		
5日	25.0	1424	1396	975-1000℃		1310	1280	1250	1221	1193	1165	1137	1112	1085	1060	1034	1006	980	952	924	897	869	842	813	782	754	727	701	677	649	620	591	563	535	507	478	449
6日	25.1			1000-1050℃											1085	1059	1031	1005	977	949																	
7日	25.4	1474	1446	1050-1100℃		1361	1330	1301	1271	1243	1215	1187	1162	1136	1110	1084	1057	1030	1002	975	947	919	892	863	833	804	777	751	728	699	670	641	614	586	557	529	499
8日	25.7																1082	1056	1028	1000	973	945															
9日	24.5	1524	1497	1470	1441	1411	1380	1351	1322	1293	1265	1237	1213	1186	1160	1135	1107	1080	1052	1025	997	970	942	913	883	854	828	802	778	750	721	691	664	636	607	579	549
10日	24.2																		1076	1049	1022	994	966	937													
11日	23.9															1183	1153	1128	1100	1073	1046	1018	990	961	931	902	876	850	826	798	769	740	712	684	655	627	598
12日	23.5																			1097	1069	1041	1014	985	955	926											
13日	23.0															1229	1202	1175	1147	1120	1092	1064	1037	1008	978	949	922	896	872	844	815	786	759	731	702	673	644
14日	22.7																					1087	1059	1031	1000	972	945										
15日	22.4															1274	1247	1220	1192	1165	1137	1109	1082	1053	1023	994	967	941	918	889	860	831	804	776	747	718	689
16日	22.3																							1075	1045	1016	990	964	940								
17日	22.0															1319	1291	1264	1236	1209	1181	1154	1126	1097	1067	1038	1012	986	962	934	905	876	848	820	791	763	734
18日	21.7																								1089	1060	1033	1007	984	955	926						
19日	21.5															1362	1334	1307	1279	1252	1225	1197	1169	1140	1110	1082	1055	1029	1005	977	948	919	891	863	835	806	777
20日	21.3																										1076	1050	1026	998	969	940					
21日	21.0															1394	1376	1350	1322	1294	1267	1239	1212	1183	1153	1124	1097	1071	1047	1019	990	961	934	906	877	848	819
22日	20.8																											1092	1068	1040	1011	982	954	926			
23日	20.6															1445	1418	1391	1363	1336	1308	1281	1253	1224	1194	1165	1139	1113	1089	1060	1031	1002	975	947	918	890	860
24日	20.3																													1081	1052	1023	995	967	939		
25日	20.1															1486	1458	1431	1404	1376	1349	1321	1293	1265	1234	1206	1179	1153	1129	1101	1072	1043	1015	987	959	930	901
26日	19.9																														1092	1063	1035	1007	979	950	
27日	19.7															1525	1498	1471	1443	1416	1388	1361	1333	1304	1274	1245	1219	1193	1169	1140	1111	1082	1055	1027	998	970	940
28日	19.5																																1074	1046	1018	989	960
29日	19.4	1954	1926	1900	1870	1841	1810	1781	1751	1723	1695	1667	1642	1616	1590	1564	1537	1510	1482	1455	1427	1399	1372	1343	1313	1284	1257	1231	1208	1179	1150	1121	1094	1066	1037	1009	979
30日	19.2																																	1085	1056	1028	999

8月

9月

収穫適期のめやす

	品種名	収穫適期の出穂後積算気温 通常年	収穫適期の出穂後積算気温 高温登熟年
極早生	なつひめ	1000-1100℃	-
極早生	新潟次郎（飼料用）	1000℃	-
早生	こしいぶき、わたぼうし、五百万石	975℃	-
早生	ゆきん子舞	950-1000℃	-
早生	ちほみのり	1050-1200℃	-
早生	つきあかり	1100-1200℃	-
中生	コシヒカリ	1000℃	950℃
中生	こがねもち	1000℃	-
晩生	新之助	1050-1100℃	1000-1050℃
晩生	あきだわら	1050-1100℃	-

コメント
■地域やほ場により生育や出穂期、気温などが異なるため、籾の黄化割合を確認して判断する。