

R8水稻収穫適期情報(標高340m)

R8.9.13 現在
南魚沼農業普及指導センター

アメダス(湯沢)の平均気温(9月13日 以降はR5～7年の平均値)から算出。

☆積算温度は一つのめやすとして、必ずほ場で籾の黄化率を確認してください
(緑色籾が1割程度残っている頃が適期)

積算めやす 出穂期	900℃	950℃	1000℃	1050℃	1100℃
7/28(火)	9/2	9/5	9/7	9/9	9/12
7/29(水)	9/3	9/6	9/8	9/10	9/13
7/30(木)	9/5	9/7	9/9	9/12	9/14
7/31(金)	9/6	9/8	9/10	9/13	9/15
8/1(土)	9/7	9/9	9/12	9/14	9/16
8/2(日)	9/8	9/10	9/13	9/15	9/17
8/3(月)	9/9	9/12	9/14	9/16	9/18
8/4(火)	9/10	9/13	9/15	9/17	9/19
8/5(水)	9/12	9/14	9/16	9/18	9/20
出穂 8/6(木)	9/13	9/15	9/17	9/19	9/21
盛 8/7(金)	9/14	9/16	9/18	9/20	9/23
期 8/8(土)	9/15	9/17	9/19	9/22	9/24
8/9(日)	9/16	9/18	9/20	9/23	9/25
8/10(月)	9/17	9/19	9/22	9/24	9/27
8/11(火)	9/18	9/20	9/23	9/25	9/28
8/12(水)	9/19	9/21	9/24	9/26	9/29
8/13(木)	9/20	9/23	9/25	9/28	9/30
8/14(金)	9/21	9/24	9/26	9/29	10/1
8/15(土)	9/23	9/25	9/28	9/30	10/3
8/16(日)	9/24	9/27	9/29	10/2	10/4
8/17(月)	9/25	9/28	9/30	10/3	10/6
8/18(火)	9/27	9/29	10/2	10/4	10/7
8/19(水)	9/28	9/30	10/3	10/6	10/9
8/20(木)	9/29	10/2	10/5	10/7	10/9

品種別積算温度のめやす

	平年	高温年*
五百万石	975	925
こしいぶき		
こがねもち	1000	950
コシヒカリ		
新之助	1,050～1,100	1,000～1,050



*出穂後5～24日の20日間の平均気温が概ね26℃を超える年